

Fenologické fáze podle BBCH: 09 - Slunečnice (BBCH)

00	suché semeno (v této fázi jsou semena mořena) Zálivka po výsevu přípravkem Fyto-fitness HNPk Sp., ředění 1: 50, 500 L/ ha
01	počátek bobtnání
03	konec bobtnání
05	klíčnicí kořen vystoupil ze semene
06	klíčnicí kořen prodloužený, tvoří vlášení
07	hypokotyl s děložními listy protrhl slupku semene
08	hypokotyl s děložními listy prorůstá k povrchu půdy
09	vzcházení: děložní listy pronikají nad povrch půdy
10	děložní listy plně vyvinuté
12	2 listy (1. pár listů) vyvinuté Aplikace přípravku Fyto-fitness Basic+ ředění 1: 100, FF HNPk Sp. 1: 100, 200 L/ ha
14	4 listy (2. pár listů) +++
15	5 listů vyvinuto ++
19	6 až 9 a více listů vyvinuto +
30	počátek prodlužovacího růstu Aplikace přípravku Fyto-fitness Basic+ ředění 1: 100, FF HNPk Sp. 1: 100, 200 L/ ha
31	1. internodium viditelné +++
32	2. internodium viditelné ++
33	3. internodium viditelné +
34	4. internodium viditelné
35	5. internodium viditelné
36	6. internodium viditelné
37	7. internodium viditelné
38	8. internodium viditelné
39	9 a více internodií viditelných
51	květní pupen již rozpoznatelný mezi mladými listy (fáze hvězdy) 1 díl FF Basic+ 1: 200 + 1 díl FF Complex 1:200 + 1 díl FF HNPk SP. 1: 100, celkem 300 L/ ha
53	květenství se odděluje od listové růžice: krycí listy zřetelně rozpoznatelné od listů +++
55	květenství se oddělilo od nejhornějšího listu +++
57	květenství se zřetelně oddělilo od listů ++
59	květenství ještě zavřené, mezi krycími listy jsou viditelné jazykovité květy +
61	počátek květu: jazykovité květy kolmo na terči: trubkovité květy viditelné ve vnější třetině úboru
63	trubkovité květy ve vnější třetině terče kvetou (volné tyčinky a blizny)
65	plný květ: trubkovité květy ve střední třetině terče kvetou (volné tyčinky a blizny)
67	dokvétání: trubkovité květy ve vnitřní třetině terče kvetou (volné tyčinky a blizny)
69	konec květu: všechny trubkovité květy odkvetly, ve vnější až střední třetině terče viditelné nasazování plodů, jazykovité květy zaschlé či opadlé Aplikace přípravku Fyto-fitness Basic+ ředění 1: 100, FF HNPk Sp. 1: 100, 300 L/ ha
71	semena ve vnější třetině terče jsou šedá a dosáhla druhově resp. odrůdově specifické velikosti +++

75	semena ve střední třetině terče jsou šedá a dosáhla druhově resp. odrůdově specifické velikosti Aplikace přípravku Fyto-fitness Basic⁺ ředění 1: 100, FF HNPk Sp. 1: 100, 300 L/ ha
79	semena ve vnitřní třetině terče jsou šedá a dosáhla druhově resp. odrůdově specifické velikosti ++
81	začátek zrání: semena ve vnější třetině terče černá, slupka (oplodí) semen tvrdá, zadní strana úboru ještě zelená
83	citronová zralost: zadní stěna úboru žluto-zelená: krycí listeny ještě zelené, vlhkost semen asi 50 %
85	postupující vyzrání semen: semena ze střední třetiny černá, zadní strana úboru žlutá, krycí listeny s hnědými okraji, vlhkost semen asi 40 %
87	fyzilogická zralost: zadní strana úboru žlutá: krycí listeny ze 3/4 hnědé, vlhkost semen 20–25 %
89	plná zralost: semena i ve vnitřní třetině terče černá: zadní strana úboru hnědá, mramorovaná, krycí listeny hnědé: vlhkost semen asi 15 %
92	mrtvá zralost: vlhkost semen asi 10 %
97	rostlina odumřela
99	sklizňová zralost

Vysvětlivky:

XXXXXXX Nejlepší doba aplikace

+++ Velmi vhodná doba aplikace

++ Vhodná doba aplikace

+ Méně vhodná doba aplikace