

Basic
Basic +
Complex

APLIKAČNÍ DIAGRAM



TYP ROSTLINY	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												

A: Stromy a keře, polodřeviny: ovocné vč. révy, listnaté, jehličnany, lesní i okrasné

B: Zelenina rychlená: listový salát, ředkvičky, mrkev, celer, kedlubny, zelí, kapusta, bylinky

C: Zelenina nerychlená: listový salát, ředkvičky, mrkev, celer, kedlubny, zelí, kapusta, luskoviny, bylinky

D: Dvou a víceleté rostliny: jahodník, libeček, reveň rebarbora

E: Ozimé obilniny a řepka

F: Brambory, řepa, jarní obilniny, cibule, česnek, slunečnice

G: Papriky, rajčata, okurky, cukety, lilky, patisony

Důležitá upozornění:

- Rostliny, jejichž části jsou určeny ke konzumaci (lidmi, zvíředy, ptactvem) se ošetří maximálně 5-6x za vegetační rok
- Prodleva mezi dvěma po sobě následujícími aplikacemi je zpravidla 1 až 2 týdny. V případě zvýšeného výskytu houbových, bakteriálních chorob, popř. viróz lze interval zkrátit
- Venkovní teplota pro aplikaci nesmí přestoupit 23 °C, proto v období letních veder aplikace v ranních hodinách, rosa není na závadu
- Kvetoucí rostliny se ošetřují na listy mimo květ, aby nedošlo ke smáčení pylových zrn. Aplikace na celý povrch rostliny není nezbytná. Přípravky se aplikují mlžením tryskou. Aplikace poléváním z konví s kropítkem pro zalévání je nevhodné
- APLIKAČNÍ LISTY pro přípravky Fyto-fitness podle fenologických (růstových) fází jednotlivých typů kulturních rostlin zašleme na vyžádání v elektronické formě

