

Aplikace přípravků Fyto-fitness na osivové porosty trav

Fenologické fáze podle BBCH: 05 - Trávy - Poaceae (BBCH)

| | |
|----|--|
| 00 | suché semeno (v této fázi jsou semena mořena) Zálivka výsevu přípravkem Fyto-fitness HNPk Sp., ředění 1: 50, 500 L/ ha |
| 01 | počátek bobtnání semen |
| 03 | konec bobtnání semen |
| 05 | kořínek (radicula) vystoupil ze semene |
| 06 | prodlužování kořínků, tvorba kořenových vlásků |
| 11 | první pravý list, pár listů nebo přeslen je rozvinutý |
| 12 | 2 pravé listy, listové páry nebo přesleny rozvinuty Aplikace přípravku Fyto-fitness Basic⁺ ředění 1: 100, FF HNPk Sp. 1: 100, 200 L/ ha |
| 13 | 3 pravé listy, listové páry nebo přesleny rozvinuty +++ |
| 14 | 4 pravé listy, listové páry nebo přesleny rozvinuty ++ |
| 15 | 5 pravých listů, listových párů nebo přeslenů rozvinuto + |
| 16 | 6 pravých listů, listových párů nebo přeslenů rozvinuto |
| 17 | 7 pravých listů, listových párů nebo přeslenů rozvinuto |
| 18 | 8 pravých listů, listových párů nebo přeslenů rozvinuto |
| 19 | 9 nebo více pravých listů, listových párů nebo přeslenů rozvinuto (Odnožování, vývoj postranních výhonů, nebo prodlužování stonků může probíhat v dřívější fázi, nebo postranní výhony se nemusí vůbec vytvořit.) Aplikace přípravku Fyto-fitness Basic⁺ ředění 1: 100, FF HNPk Sp. 1: 100, 300 L/ ha |
| 21 | první odnož viditelná +++ |
| 22 | 2 odnože viditelné ++ |
| 23 | 3 odnože viditelné + |
| 24 | 4 odnože viditelné |
| 25 | 5 odnoží viditelných |
| 26 | 6 odnoží viditelných |
| 27 | 7 odnoží viditelných |
| 28 | 8 odnoží viditelných |
| 29 | 9 nebo více odnoží viditelných |
| 31 | jedno kolénko zjizitelné 1 díl FF Basic⁺ 1: 100 + 1 díl Complex 1:200 + 1 díl FF HNPk Sp. 1: 100, celkem 300 L/ ha |
| 32 | dvě kolénka zjizitelná ++ |
| 33 | 3 kolénka zjizitelná + |
| 34 | 4 kolénka zjizitelná |
| 35 | 5 kolének zjizitelných |
| 36 | 6 kolének zjizitelných |
| 37 | 7 kolének zjizitelných |
| 38 | 8 kolének zjizitelných |

| | |
|----|---|
| 39 | 9 nebo více kolének patrných |
| 41 | pochva praporcového listu se prodlužuje |
| 43 | pochva praporcového listu právě viditelná zduřelá (středně zduřelá) Aplikace přípravku Fyto-fitness Basic⁺ ředění 1: 100, FF HNPk Sp. 1: 100, 300 L/ ha |
| 45 | pochva praporcového listu zduřelá ++ |
| 47 | pochva praporcového listu se otvírá + |
| 49 | viditelné první osiny |
| 51 | počátek metání |
| 55 | objevila se první květenství (střední fáze metání) |
| 59 | celé květenství viditelné (konec metání) |
| 61 | počátek květu: prvé prašníky viditelné |
| 65 | střed květu: 50% prašníků zralých |
| 69 | konec květu Aplikace přípravku Fyto-fitness Basic⁺ ředění 1: 100, FF HNPk Sp. 1: 100, 300 L/ ha |
| 71 | obsah zrn vodnatý |
| 75 | mléčná zralost Aplikace přípravku Fyto-fitness Basic⁺ ředění 1: 100, FF HNPk Sp. 1: 100, 300 L/ ha |
| 77 | pozdní mléčná zralost |
| 85 | těstovitá (vosková) zralost |
| 87 | žlutá zralost |
| 89 | plná zralost, zrno je tvrdé |
| 93 | zrna se uvolňují |
| 97 | rostlina plně odumřela, stéblo se láme Vysvětlivky: XXXX text, +++: velmi vhodná doba pro aplikaci, ++ vhodná doba pro aplikaci, + méně vhodná doba pro aplikaci |

Při aplikaci přípravku se řídíme BBCH, abiotickými podmínkami, infekčním tlakem, dávkování lze dle stavu porostu upravit po konzultaci.